


Location

Our office is located in the single story building in the Hospital Center Common located across from Hilton Head Hospital.

We are located on the web at:

www.HHISurgeons.com



Performing Surgeries at:

- Hilton Head Hospital
- Outpatient Surgery Center of Hilton Head

Surgery by Surgeons

A fully trained surgeon is a physician who, after medical school, has gone through at least five years of training in an accredited residency program to learn the specialized skills of a surgeon. One good sign of a surgeon's competence is certification by The American Board of Surgery, a national surgical board approved by the American Board of Medical Specialties. All such board-certified surgeons have satisfactorily completed an approved residency training program and have passed a rigorous specialty examination.

The letters F.A.C.S. stands for Fellow of the American College of Surgeons. Surgeons who become Fellows of the College have passed a comprehensive evaluation of their education, training, and professional qualifications. Their credentials have been found to be consistent with the standards established and demanded by the College.

SURGICAL SPECIALISTS

HILTON HEAD GENERAL & LAPAROSCOPIC SURGERY, PA

25 Hospital Center Commons
Suite 100

Hilton Head Island, SC 29926

Phone: 843-681-9489

Fax: 843-681-4502

www.HHISurgeons.com

INFORMACION SOBRE VESICULA BILIAR

SURGICAL SPECIALISTS

HILTON HEAD GENERAL & LAPAROSCOPIC SURGERY

Thomas P. Rzczycki, MD, FACS

Richard L. Hussong, Jr., MD,
FACS

Christopher L. Culpepper, MD

Board Certified
General Surgeons

ENFERMEDADES DE LA VESICULA BILIAR

LA VESICULA BILIAR

La vesicula biliar es un saco pequeño que esta junto al higado. La vesicula esta localizada en la parte superior del abdomen, debajo de las costillas. La vesicula se conecta con el conducto biliar comun (CBD) a traves del tubo cistico. La bilis es una sustancia producida por el higado y esta sustancia ayuda en la digestion de las grasas. La vesicula guarda la bilis y se contrae para dejar salir la bilis hacia el intestino cuando hay comida para digerir.

ENFERMEDADES DE LA VESICULA

La enfermedad de la vesicula es usualmente debida a piedras en la vesicula. Aproximadamente un 10% de la poblacion en los Estados Unidos tiene piedras en la vesicula. La probabilidad de tener piedras aumenta con la edad y es mas prevalente en las mujeres. Afortunadamente, muchas personas con piedras en la vesicula nunca llegan a enfermarse de la vesicula.

La enfermedad de la vesicula que se desarrolla sin la presencia de piedras es el resultado de que la vesicula se vacia anormalmente y esta condicion se llama diskinesia biliar.

SINTOMAS

La mayoría de las personas con enfermedad de la vesicula tienen sintomas, sin embargo algunos sintomas pueden ser muy leves. Generalmente, los pacientes pueden tener dolor muy fuerte en la parte superior derecha del abdomen. El dolor puede extenderse a la espalda y al hombro derecho. En muchas ocasiones el dolor viene acompañado de nausea y vomitos y a veces se alivia con eructos y vomitos. Estos episodios de dolor pueden ser ocasionados por la comida, especialmente si la comida es grasosa y picante. El dolor es causado por las piedras bloqueando el

tubo cistico. Este tubo es el que lleva la bilis desde la vesicular al conducto biliar comun (CBD). A veces la piedra puede pasar al conducto biliar comun y si la piedra bloquea el conducto biliar comun, la piel y los ojos pueden ponerse amarillos, desarrollando lo que se llama "jaundice".

El conducto biliar comun pasa por el pancreas hasta llegar a vaciar en el intestino, y si una piedra sigue este camino puede causar inflamacion del pancreas (Pancreatitis). Los sintomas de pancreatitis se presentan como un dolor muy fuerte en la parte superior del abdomen y/o en la parte media de la espalda, acompañado con nausea y vomitos. La presencia de fiebre, jaundice o pancreatitis con un ataque de la vesicula es muy serio y debe comunicarse inmediatamente al medico.

DIAGNOSTICO

Debido a que la mayoría de las enfermedades de la vesicula son causadas por las piedras en la vesicula, el diagnostico inicial se obtiene con un ultrasonido. El ultrasonido es un procedimiento que no causa dolor y usa ondas de sonido para visualizar la vesicula y detectar la presencia o ausencia de piedras. Si no se encuentran piedras pero se sospecha que existe enfermedad de la vesicula, se puede hacer un examen especial llamado HIDA Scan. Este examen se hace inyectando un colorante en el higado y los conductos biliares y se puede ver si la vesicula se llena y despues vacia la bilis en el intestino normalmente. Si la vesicula no se vacia normalmente y si hay dolor, el paciente tiene "diskinesia" biliar.

TRATAMIENTO

La unica curacion para la enfermedad de la vesicula es operar para sacar la vesicula y las piedras. Hay dos clases de cirugia y ambas se hacen con anestesia general.

CIRUGIA LAPAROSCOPICA—Esta cirugia se usa para el noventa y cinco por ciento de los casos. En este procedimiento, se inserta una camara de video y otros instrumentos a

traves de varios cortes pequeños. El corte mas grande de aproximadamente una pulgada de largo, se hace en el ombligo y este es el corte donde se mete la camara. Los otros cortes son mas pequeños se hacen debajo de las costillas del lado derecho. Con esta operacion los pacientes regresan a casa el mismo dia. En un cinco por ciento de los casos, el cirujano determina que no es posible sacar la vesicula con este procedimiento y es necesario efectuar la cirugia abierta.

CIRUGIA /OPERACION ABIERTA—Con este procedimiento se saca la vesicula haciendo un corte de varias pulgadas de largo, debajo de las costillas sin usar la camara de video. Esta operacion es mas dolorosa y requiere hospitalizacion de 3 a 5 dias.

COMPLICACIONES

La mayoría de las operaciones de la vesicula ocurren sin mayor complicacion, sin embargo, ninguna cirugia es completamente sin riesgo. Hay probabilidades de 1-3% de riesgo de infeccion y menos de 1% de riesgo de hemorragia. Menos del 5% de los pacientes sufren de diarrea despues de la cirugia. Una de las mayores complicaciones es el daño al Conducto Biliar Comun (CBD), esto puede necesitar otra operacion o reparacion en un centro de cirugia especializado. Afortunadamente esta complicacion no es comun y ocurre solamente una vez en cada 500 casos.

RECUBRO

Todos los pacientes son diferentes y no todas las operaciones son iguales; por esta razon, el recobro varia de persona a persona. Con la cirugia Laparoscopica los pacientes reportan que el dolor mas fuerte dura entre dos y siete dias y experimentan cansancio y debilidad. Con la operacion abierta, el recobro dura varias semanas y generalmente el paciente no debe levantar pesos mayores de 10 libras por seis semanas. No hay restricciones en la dieta para los pacientes que no tienen la vesicular.